Voyage du Comte de Rohan-Chabot en Afrique équatoriale. Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle d'Ægeriidæ (Lepidopt. Hétérocère),

par M. F. Le Cerf.

Nyctaegeria nov. gen.

Corps élancé, couvert de longs poils sur le thorax et la base de l'abdomen, où ils forment deux touffes dressées inégales. Tibias médians et postérieurs faiblement hérissés; antennes longues et minces, à peine épaissies à l'extrémité, brièvement ciliées. Palpes hérissés à troisième article court et obtus. Trompe présente, médiocrement développée. Ailes assez larges et arrondies, opaques, à franges longues; leur nervulation est la suivante:

Aux ailes supérieures, la nervure 2 naît avant l'angle inférieur de la cellule, d'où part 3 qui est aussi écartée de 4 que de 2; 7 et 8 tigées; 10 et 11 parallèles très rapprochées à la base et dans tout leur parcours.

Aux ailes inférieures, les nervures 1ª et 1ᶜ sont présentes; 3 et 4 naissent du même point à l'angle inférieur de la cellule ou sont tigées sur le quart environ de leur longueur; discocellulaire supérieure un peu plus courte que l'inférieure, toutes deux très obliques.

Nyctaegeria Rohani nov. sp.

♂ : Front noir bronzé, recouvert d'écailles piliformes dressées, se confondant avec celles du vertex, noir fuligineux; toupet occipital, poils péricéphaliques et plaque jugulaire concolores. Palpes hérissés, noir fuligineux. Trompe jaune. Antennes jaunâtres ternes en dessus de la base aux deux tiers de leur longueur, brunâtres en dessous, noires à l'extrémité; pinceau terminal concolore.

Thorax recouvert en entier de longs poils soyeux noir fuligineux luisants qui se prolongent sur le dessus des deux premiers segments abdominaux et y forment deux touffes dressées dont l'antérieure est la plus volumineuse.

Abdomen écaillé de part et d'autre de noir brunâtre luisant, terminé par une brosse anale allongée, noir fuligineux.

Ailes supérieures uniformément bronzé foncé ou éclairci jusqu'au jaunâtre sur le disque et chatoyant légèrement en pourpre violacé. Côte et

espace terminal plus foncé mais sans ligne marginale distincte. Point discocellulaire concolore formant un relief tectiforme assez net. Dessous plus pâle, en majeure partie lavé de jaunâtre.

Ailes inférieures couvertes d'écailles jaune ocracé très pâle, un peu plus denses sur la discocellulaire supérieure et le champ anal, et bordées par une fine ligne marginale bronzé noirâtre. Dessous semblable. Frange des quatres ailes bronzé luisant.

Hanches antérieures et fémurs de toutes les pattes couverts de longs poils noir fuligineux formant des franges épaisses et longues au bord inférieur. Tibas antérieurs noirs en dessus, jaunâtres inférieurement avec l'épiphyse tibiale partiellement mêlée de noir. Tibias médians et postérieurs à pilosité noir fuligineux: éperons jaune clair. Tarses des trois paires de pattes jaunâtres, un peu obscurcis extérieurement et munis en dessous de très courtes épines noires peu nombreuses.

Envergure : 29 à 31 millimètres.

Femelle inconnue.

Types : deux mâles provenant de Angola-Zambèze, dans la collection du Muséum de Paris. Cette espèce est dédiée à l'éminent voyageur qui l'a découverte.